

بسم الله الرحمن الرحيم





شبكة المعلومات الجامعية التوثيق الالكتروني والميكروفيلم



جامعة عين شمس

التوثيق الإلكتروني والميكروفيلم

قسم

نقسم بالله العظيم أن المادة التي تم توثيقها وتسجيلها
علي هذه الأقراص المدمجة قد أعدت دون أية تغيرات



يجب أن

تحفظ هذه الأقراص المدمجة بعيدا عن الغبار





بعض الوثائق الأصلية تالفة





بالرسالة صفحات لم ترد بالأصل



الدكتورة
فرات سنكري

الحمل المتعدد

Multiple Pregnancy

بحث علمي أعد لنيل شهادة الدراسات العليا "الماجستير"
في التوليد وأمراض النساء

أعد في قسم التوليد وأمراض النساء

ياشرف الأستاذ الدكتور

محمد نذير ياسمينه

برئاسة الأستاذ الدكتور

عماد الدين تنوخي

١٩٩٥ - ١٩٩٤


جامعة دمشق

كلية الطب

B 117-ع

(فَلْيُضْمِرْ نَوْرَكُمْ هَكَذَا قَدَامَ النَّاسِ
لَكِي يَرَوْا أَعْمَالَكُمْ الْحَسَنَةَ وَيُمَجِّدُوا
أَبَاكُمْ الَّذِي فِي السَّمَوَاتِ)

(متى ٥: ١٦)



قوله لما اقيمتها بسفنا ردا

بالسنة كما في نسخة

في نسخة في نسخة

في نسخة

قوله ما - المبح - بال - وقال في نسخة

كلمة شكر

في نهاية هذه المرحلة الحافلة بالجد والعمل يطيب لي أن أشكر السادة الأساتذة في
دار التوليد وأمراض النساء الجامعي .

وأخص بالذكر :

- الأستاذ الدكتور محمد نذير ياسمينه الذي كان له كبير الفضل
في إخراج هذه الأطروحة بما قدمه من ثمين الوقت والعلم والنصح .
- الأستاذ الدكتور عماد الدين تنوخي رئيس قسم التوليد وأمراض النساء
- الأستاذ الدكتور ابراهيم حقي لتفضلهما بمناقشة البحث
- جميع طلاب الدراسات العليا والموظفات الذين ساعدوا في إتمام هذا العمل .

مخطط البحث

أولاً - القسم النظري :

- العرق
- الوراثة
- عمر الأم وتعدد الولادات
- حانات القند داخلية المنشأ
- أدوية العقم
- الالتقاح في الزجاج
- معدل الجنس في الحمل المتعددة

الآلية الإمراضية للحمل المتعدد :

- الحمل التوأمي وحيد البيضة
- الحمل التوأمي ثنائي البيضة
- تعريف الزيجية
- الحمل الإضافي والالتقاح الإضافي
- الخيميرية
- الرخى العدارية
- الآلية الامراضية للحمل الثلاثي أو أكثر

التكيف الوالدي :

الاختلاطات :

- الاجهاض
- التشوهات الجنينية
- الولادة المبكرة
- تأخر النمو داخل الرحم
- التطور التالي
- موت أحد الأجنة

- وفیات حول الولادة
- متلازمة نقل الدم بين التوائم
- الاستسقاء الأمنيوسي
- داء ريسوس
- الاقياء المعنفة
- فرط التوتر الشرياني
- فقر الدم
- نزوف أشهر الحمل الأخيرة
- النزف بعد الولادة
- حوادث السرر
- المحيطات المعينة أثناء المخاض
- التشخيص : القصة والفحص السريري
- الاستقصاءات التشخيصية :

- فوق الصوت - الفحص الشعاعي - الاختبارات الكيميائية اليومية
- التدبير خلال الحمل :
- العناية الروتينية بالحامل - التغذية
- فرط التوتر عند الأم - كشف التشوهات خلال الحمل
- ترصد الجنين - النضج الرئوي عند التوائم
- الوقاية من الولادة المبكرة مثل الراحة في السرير - مقلدات
- البيتا - الروجسترون - ترصد الانتان ومكافحته - تطويق عنق الرحم
- ملخص التدبير خلال الحمل

تدبير المخاض والولادة :

- المخاض - الولادة المهبلية
- ولادة التوأم الثاني - التحويل بالأعمال الداخلية
- العملية القيصرية - ثلاثة أجنة أو أكثر

النفاس

ثانياً - القسم العملي :

- نسبة الحدوث - تأثير الوراثة - جنس الأجنة
- الزيجية - وزن الولادة - الإشراف الطبي
- فرط التوتر أثناء الحمل - الاستسقاء الأمنيوسي - انبثاق الأغشية الباكر
- نزوف أشهر الحمل الأخيرة - نزوف الخلاص - التشوهات الجنينية الخلقية
- مجينات التوائم - طريقة الولادة - العملية القيصرية
- ملقط الجنين - استخراج المقعد بالتحويل بالأعمال الداخلية
- وفيات حول الولادة - نماذج للمتابعة

- توصيات

- المراجع

الحمل المتعدد Multiple Pregnang

قليلة هي الأبحاث التوليدية التي أثارت اهتماماً أكبر وكان لها أدب طبي أكثر مما للحمل المتعدد ولذلك تكاثفت الجهود لجمع وافر المعلومات عن التوائم في فرع جديد من العلوم سمي علم التوائم Gemellology .

وتزداد الاختلاطات بزيادة عدد الأجنة ولحسن الحظ فالحمل الثلاثية والرابعة نادرة الحدوث .

نسبة الحدوث Incidence :

- نسبة حدوث التوائم وحيدة البيضة ثابتة نسبياً في كل العالم وهي ٢٥٠/١ ولادة وهي مستقلة عن العرق - الوراثة - العمر - تعدد الولادات وخلافاً للماضي يتضح حديثاً أن نسبة انشطار البيضة يتضاعف عقب تحريض الاباضة حسب Derom وزملاؤه عام ١٩٨٧ .

- تتأثر نسبة حدوث التوائم ثنائية البيضة بوضوح بالعرق - الوراثة - عمر الأم (٣٥-٣٩) - عدد الولادات وأدوية الخصب .

بينت الدراسات أن استخدام مانعات الحمل أكثر من ستة أشهر ثم حدوث الحمل خلال شهر واحد من إيقافها يضاعف نسبة الحمل التوأمي .

- ومع تطور الأمواج فوق الصوتية في تقييم الحمل أصبح من الواضح أن نسبة حدوث الحمل المتعدد قد تكون أشيع مما سبق فحسب دراسة Jauniaux ومساعديه عام ١٩٨٨ تبين أن التهديد بالانقراض قد ينتهي إلى إجهاض فعلي لواحد من أجنة حمل متعدد غير مشخص بينما يستمر الآخر بالنمو والتطور .

وقد ينتهي الحمل التوأمي خلال الثلث الأول للحمل إلى ولادة طفل مع بيضة رائية أو بيضة رائية مع إسقاط منسي أو بيضتين رائقتين وذلك في معطيات دراسة Caines Robinson

١٩٧٧ و Varma عام ١٩٧٩ (١- ص ٨٩٢) .