



شبكة المعلومات الجامعية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ





شبكة المعلومات الجامعية



شبكة المعلومات الجامعية

التوثيق الالكتروني والميكرو فيلم

جامعة عين شمس

التوثيق الالكتروني والميكرو فيلم

قسم

نقسم بالله العظيم أن المادة التي تم توثيقها وتسجيلها
علي هذه الأفلام قد اعدت دون أية تغيرات



يجب أن

تحفظ هذه الأفلام بعيداً عن الغبار

في درجة حرارة من 15 – 20 مئوية ورطوبة نسبية من 20-40 %

To be kept away from dust in dry cool place of
15 – 25c and relative humidity 20-40 %



شبكة المعلومات الجامعية



بعض الوثائق الأصلية تالفة



شبكة المعلومات الجامعية



بالرسالة صفحات
لم ترد بالأصل

The Role of Chlamydia trachomatis in The First Trimesteric Abortion

A Thesis

Submitted in Partial Fulfillment of The M.D. Degree in
Obstetrics & Gynaecology

Submitted by

Essam Yehia Mahmoud El-Gabbas

Specialist of Obstetric and Gynaecology in Naser Hospital (Port-Said)

Supervisors


Prof. Dr. Hussein Aly Shaaban

Prof. of Obstetrics & Gynaecology
Faculty of Medicine - Cairo University




Prof. Dr. Hicham Ezzat Mohamed Mokbel Ezzat

Prof. of Microbiology and Immunology
Faculty of Medicine - Cairo University



B 9.C9

**Faculty of Medicine
Cairo University
2001**





سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا
إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ

(البقرة - الآية رقم ٣٢)

بسم الله الرحمن الرحيم

تقرير لجنة الحكم على الرسالة المقدمة من الطبيب/ عصام يحيى محمود الجباس

اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة الأساتذة :

أ.د./ حسين على شعبان أستاذ التوليد وأمراض النساء كلية الطب- جامعة القاهرة

أ.د./ سميرة يوسف الملاح عميدة كلية طب الأزهر بنات- جامعة الأزهر

أ.د./ يوسف عبد الله أبو حامد أستاذ الميكروبيولوجى والمناعة كلية الطب- جامعة القاهرة

وذلك فى تمام الساعة الواحدة ظهراً يوم السبت الموافق 2001/10/13 بقاعة المؤتمرات- بكلية طب القصر العينى لمناقشة الرسالة المقدمة من الطبيب/ عصام يحيى محمود الجباس توطئة لدخول امتحان الدكتوراه فى التوليد وأمراض النساء. وعنوانها :

دور المتدثرة الحثرية فى إحداث الإجهاض فى الثلث شهور الأولى للحمل

وقد قام الباحث بعرض رسالته فى 285 صفحة بخلاف الملخص العربى واشتملت الدراسة على 394 مرجعاً وقد قسّمت الرسالة إلى الأجزاء التالية :

الجزء الأول : مقدمة الموضوع والهدف من البحث.

الجزء الثانى : استعراض لموضع الإجهاض والإجهاض المتكرر ومعدل انتشاره وأسبابه وكيفية علاجه والوسائل المستخدمة للحث على إحداث الإجهاض القانونى والطبى.

الجزء الثالث : استعراض لدور المتدثرة الحثرية (الكلاميديا) فى إحداث الإجهاض وتأثيرها على الحمل.

الجزء الرابع : استعراض لدور المناعة المكتسبة من المتدثرة الحثرية.

الجزء الخامس : استعراض للوسائل المختلفة فى تشخيص المتدثرة الحثرية وكيفية علاجها وطرق الوقاية من حدوثها لتجنب مضاعفاتها.

الجزء السادس : استعراض لطريقة البحث والدراسة. وهى عبارة عن 60 سيدة مقسمة إلى ثلاثة

مجموعات كل مجموعة 20 سيدة، المجموعة الأولى (أ) 20 سيدة تعاني من الإجهاض التكرار

والمجموعة (ب) 20 سيدة فى حالة إجهاض لأول مرة، ومجموعة (ج) مجموعة ضابطة. وأخذ

عينات من (مصل الدم) كل السيدات لتحليلها بطريقة (اليزا) لميكروب الكلاميديا ثم استخدام طريقة

الستفاعل المتسلسل لخميرة البلعرة فى أنسجة عنق الرحم لمجموعة (أ)، (ج) وفى محتويات

الإجهاض للمجموعة (ب).

الجزء السابع : استعراض النتائج التى توصلت إليها الرسالة ومقارنتها بنتائج بعض الأبحاث والدراسات

الأخرى مع التوصيات بناء على نتائج البحث التى يمكن تطبيقها والتى تم استخلاصها من البحث.

الجزء الثامن : ملخص للدراسة باللغة الإنجليزية.

الجزء التاسع : المراجع.

الجزء العاشر : الملخص العربى.

المتندثرة الحثرية هي أكثر الأمراض التناسلية انتشاراً وهي تسبب التهابات حادة ومزمنة للجهاز التناسلى الأنثوى. ومعدل انتشارها فى جمهورية مصر العربية فى تزايد وتبلغ نسبة انتشارها من نتائج البحث بين 15-18% من مجموع الحالات المستخدمة فى البحث.

والهدف من البحث الحالى هو دراسة الدور المحتمل للإصابة بالمتندثرة الحثرية فى إحداث الإجهاض فى الثلاثة شهور الأولى للحمل.

وأجريت الدراسة الحالية على 60 حالة 20 تشتمل من جهاز متكرر كون مجموعة (أ)، و20 تشتمل من إجهاض لأول مرة وفى حالة إجهاض محتّم مجموعة (ب)، و20 حالة لسيدات لم يحد لهم إجهاض مجموعة ضابطة (جـ). وتم عمل الفحوص الخاصة بالمتندثرة الحثرية فى وحدة الفيروسات بقسم الميكروبيولوجيا البيطية والمناعة بكلية طب القصر العينى جامعة القاهرة فى الفترة من 1 يناير 1999 إلى نهاية يناير 2001.

وقد تم فحص السيدات إكلينيكيًا ومعملياً وإجراء التحاليل الطبية وتحاليل الهرمونات والفيروسات الخاصة التى قد تكون عاملاً فى حدوث الإجهاض لاستبعادها كعامل مؤثر فى نتائج البحث. وتم البحث عن الأجسام المضادة (جـ) فى مصل السيدات المتسببة فى الإصابة بالمتندثرة الحثرية بطريقة (اليزا) بينما تم البحث عن الحمض النووى للمتندثرة الحثرية بطريقة التفاعل المتسلسل لخميرة البلمرة (PCR) فى أنسجة عنق الرحم الداخلى للمجموعة الضابطة (جـ)، والمجموعة الضابطة (أ) ذات الإجهاض المتكرر. أما المجموعة (ب) ذات الإجهاض الأول ثم أخذ عينة من محتويات الإجهاض نفسه.

وكانت نتائج الدراسة كالتالى :

بالنسبة للأجسام المضادة كانت النسبة المئوية لتواجدها فى مجموعة الإجهاض المتكرر 20%، فى مجموعة الإجهاض لأول مرة 25%، وفى المجموعة الضابطة (جـ) 10%. أما بالنسبة لوجود الحمض النووى بطريقة التفاعل المتسلسل لخميرة البلمرة فكانت النتائج 25% فى حالات الإجهاض المتكرر، 5% فى حالات الإجهاض لأول مرة، 5% فى المجموعة الضابطة. وتشير النتائج إلى دور محتمل للمتندثرة الحثرية فى إحداث الإجهاض فى الثلاثة شهور الأولى للحمل وبالذات فى حالات الإجهاض المتكرر. ومن أهم التوصيات هو وجوب فحص كل الأمهات التى تعاني من حدوث إجهاض متكرر لميكروب المتندثرة الحثرية بواسطة طريقة (اليزا) وهى طريقة سهلة رخيصة الثمن وللتأكد من الإصابة يجب إضافة تحليل التفاعل المتسلسل لخميرة البلمرة للبحث عن الحمض النووى للمتندثرة الحثرية. ويجب معالجة كل حالات الإجهاض المتكرر التى تجرى عملية الإخصاب المساء: لحدوث الحمل بواسطة مضادات حيوية فعالة.

وقد قامت اللجنة بمناقشة الباحث مناقشة عملية اتضح فيها أنه ملم بكافة نواحي الموضوع وأنه دزس باستفاضة كافة جوانبه وقد قررت اللجنة قبول الرسالة مع توجيه الشكر للسادة المشرفين.

أ.د. يوسف عبد الله أبو حامد

يوسف اسرار

أ.د. سميرة الملاح

سميرة الملاح

أ.د. حسين على شعبان

حسين على شعبان

DEDICATION

To my lovely wife Azza who suffered much during preparation of this work and for her support and encouragement to me.

Also, this work is dedicated to the memory of my late mother and late father

Dr. Essam El-Gabbas

ACKNOWLEDGMENT

I am deeply thankful and grateful to my Prof. Dr. *Hussein Ali Shaaban*, Professor of obstetrics and Gynaecology, Faculty of Medicine, Cairo University for giving me privilege of supervising this study and his truly fatherly guidance and support.

I wish to express my deepest thanks and profound gratitude to Prof. Dr. *Hicham Ezzat Mohamed Mokbel Ezzat*, Professor of Microbiology and Immunology, Faculty of Medicine, Cairo University for his skillful efforts, glorious help, and gold advices all through this work.

I would also like to express my best regards and profound gratitude to Dr. *Basma Makin El-Refay*, Lecturer of obstetrics and Gynaecology, Faculty of Medicine, Cairo University for her generous support and extreme guidance all through the course of this work.

