



شبكة المعلومات الجامعية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



شبكة المعلومات الجامعية
@ ASUNET



شبكة المعلومات الجامعية التوثيق الالكتروني والميكروفيلم



شبكة المعلومات الجامعية

جامعة عين شمس

التوثيق الالكتروني والميكرو فيلم

قسم

نقسم بالله العظيم أن المادة التي تم توثيقها وتسجيلها
علي هذه الأفلام قد أعدت دون أية تغيرات



يجب أن

تحفظ هذه الأفلام بعيدا عن الغبار

في درجة حرارة من ١٥-٢٥ مئوية ورطوبة نسبية من ٢٠-٤٠%

To be Kept away from Dust in Dry Cool place of
15-25- c and relative humidity 20-40%

بعض الوثائق الأصلية تالفة

بالرسالة صفحات لم ترد بالاصل



KASR ALAINY

THE ROLE OF RENAL BIOPSY IN NEPHROTIC PATIENTS

A Thesis

Submitted by:

Lamia'a Samir Borhan Ragheb

M.B. B.ch.

For fulfillment of the degree of M.Sc. (Paediatrics)

Supervised by:

PROF. DR. FATINA IBRAHIM FADEL

Prof of paediatrics Cairo University

DR. HAFEZ MAHMOUD BAZARAA

Assistant. Prof of paediatrics Cairo University

DR. RASHA ESSAM ELDIN ABD EL AZIZ

Lecturer of paediatrics Cairo University

Faculty of Medicine Cairo University

2011

بسم الله الرحمن الرحيم

بناء على موافقة الاستاذ الدكتور / نائب رئيس الجامعة بتاريخ ١٦ / ٥ / ٢٠١١ م اللجنة
المشكلة من الاستاذ:

(عن المشرفين) أ. د. / فتيه ابراهيم فاضل
(ممتحن داخلي) أ. د. / امل مصطفى هجرس
(ممتحن خارجي) أ. د. / اسامه ذكي احمد

بقاعة الدور التاسع لمناقشة علنية لرسالة الماجستير في طب الاطفال المقدمة
من الطيبة / لمياء سمير برهان راغب
وذلك في تمام الساعة (٩) صباحا يوم (الخميس) الموافق ٧ / ٧ / ٢٠١١
عنوان الرسالة : دور عينات الكلى في حالات المتلازمة النفروزيية .
الملخص :

كان هدف هذه الدراسة الكشف عن دور عينة الكلى لدى أطفال المتلازمة النفروزيية المترددون على عيادة الكلى
مستشفى ابو الريش. أجريت الدراسة على ٧٧ طفلا ، تتراوح أعمارهم بين ١-١٥ سنة ، تم اجراء عينات كلى لهم
في خلال عامين ٢٠٠٨ و ٢٠٠٩ . وكانت البيانات الهامة من الناحية الإحصائية أن التشخيص السريري الأكثر
شيوعا هو المتلازمة النفروزيية المقاومة لدواء الكورتيزون ، الحالة الباثولوجية المرضية الأكثر شيوعا هي
الالتهاب الكلوي بسبب التصلب البؤري و التكاثف في الخلايا المزاجلية .

وترى اللجنة قبول البحث

فتيه فاضل

اسامه ذكي

“To Dr.Amal Abu El Seoud, I hold you fast in
my fortress”

ACKNOWLEDGEMENT

The writing of this work, was an endeavour that first and foremost required the benevolence of God (SWT)

I would at this time like to express my profound gratitude to

Prof. Dr. Fatima Ibrahim Fadel, Professor of Paediatrics, Faculty of Medicine, Cairo University for her continuous, help, understanding, great kindness and gentle encouragement.

All my gratitude and appreciation to **Prof. Dr. Hafez Mahmoud Bazaraa**, Assistant Professor of Paediatrics, Faculty of Medicine, Cairo University for all his scientific guidance, enlightenment and constant effort in this endeavour.

I am also deeply indebted to **Dr. Rasha Essam El Din Abd El Aziz**, Lecturer of Paediatrics, Faculty of Medicine, Cairo University, your unfailing help, constant support and faithful advice, were fundamental for the completion of this work,

My mother, father, sister and brother, I hope I will always make you proud, thank you for all you have done for me, now and before. ALL my family and friends at the NBIC and elsewhere who stood by me, especially (Mr. Shawky, Mr. Sayed, Delleram, Omayma, Eman, Samar, Sanaa, Reham). God only knows how grateful I am to you all for your love and kindness; it has been a source of great strength throughout my life.

I only end this note with a prayer that all the patients involved in this study and even those not, gain or gained a speedy recovery.

Abstract

Nephrotic syndrome is a common disease in children , characterized by the tetrad of: oedema,proteinuria, hypoalbuminemia and hyperlipidemia.The role of renal biopsy is not only as a diagnostic tool in nephrotic syndrome but also as a tool that can be utilized in determining the treatment protocol to be followed,by studying 76 children retrospectively , 45 males and 31 females, all treated in the Abu El Reish Children's hospital , and had undergone a renal biopsy during the two years 2008 and 2009.A male predominance was found and FSGS(focal segmental glomerulosclerosis) was more common than MesPGN mesangial proliferative glomeronephritis, with males presenting predominantly with MesPGN and females presenting with FSGS.

Key words.

Nephrotic syndrome, FSGS (focal segmental glomerulosclerosis), MesPGN(mesangial proliferative glomeronephritis)

