

سامية محمد مصطفى



شبكة المعلومات الجامعية

بسم الله الرحمن الرحيم



سامية محمد مصطفى



شبكة المعلومات الجامعية



شبكة المعلومات الجامعية التوثيق الالكتروني والميكروفيلم



سامية محمد مصطفى



شبكة المعلومات الجامعية

جامعة عين شمس

التوثيق الإلكتروني والميكروفيلم

قسم

نقسم بالله العظيم أن المادة التي تم توثيقها وتسجيلها
علي هذه الأقراص المدمجة قد أعدت دون أية تغيرات



يجب أن

تحفظ هذه الأقراص المدمجة بعيدا عن الغبار



سامية محمد مصطفى



شبكة المعلومات الجامعية



بعض الوثائق الأصلية تالفة



سامية محمد مصطفى



شبكة المعلومات الجامعية



بالرسالة صفحات لم ترد بالأصل



**Burch colposuspension versus tension free
vaginal tape in management of genuine stress
incontinence in Egyptian Females**

THESIS

Submitted for partial fulfillment of

The MD Degree In

Gynaecology and Obstetrics

By

Mona Abdel Hameed Megahed, MB Bch, Msc, MRCOG.

Supervised By

Prof. Dr. Gaafar A. Kinawy, MD

Professor of Obstetrics & Gynaecology

Department of Obstetrics & Gynaecology

Cairo University

Dr. Ahmed Ibrahim A. Aref, MD

Assistant professor of Obstetrics & Gynaecology

Department of Obstetrics & Gynaecology

Cairo University

Dr. Magdy Ibrahim, MD

Assistant professor of Obstetrics & Gynaecology

Department of Obstetrics & Gynaecology

Cairo University

Cairo University

2004

B
1CEV1

2004

6, 2004
2004

بسم الله الرحمن الرحيم

وقل ريبي زكني علماً

صدق الله العظيم

جامعة القاهرة / كلية الطب
القصر العيني

تقرير لجنة الحكم على الرسالة

المقدمة من الطبية/ منى عبد الحميد عبد الحميد مجاهد

اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة الأساتذة

الأستاذ الدكتور / جعفر قناوي أستاذ امراض النساء والتوليد
كلية الطب - جامعة القاهرة (عن المشرفين)
الأستاذ الدكتور / جمال وفا أستاذ امراض النساء والتوليد
كلية الطب - جامعة عين شمس (ممتحن خارجي)
الأستاذ الدكتور / أسماء فريد أستاذ امراض النساء والتوليد
كلية الطب - جامعة القاهرة (ممتحن داخلي)

و ذلك يوم الأربعاء الموافق ٢٠٠٤/٦/٣٠ فى تمام الساعة الحادية عشر صباحا فى مركز تطوير التعليم الطبى قاعة (٢) للمناقشة و الحكم على الرسالة المقدمة من الطبية/ منى عبد الحميد عبد الحميد مجاهد للحصول الجزئى على الدكتوراة فى التوليد و امراض النساء

وعنوانها:

المقارنة بين عملية بيرش لتعليق المهبل وعملية الشريط المهبل الغير توتري في علاج السلس البولي الإجهادي في السيدات المصريات

و قد قام الباحث بعرض الرسالة فى ٢٠٥ صفحة بخلاف الملخص العربى و اشتملت على ٣٠٤ مرجع و قد قسمت الرسالة الى الأجزاء التالية:

١. مقدمة الموضوع و الهدف من البحث.
٢. مراجعة ما سبق دراسته فى موضوع البحث.
٣. (أ) تحديد مجموعة المريضات اللاتى يشملهن البحث بحيث يخلون من الأمراض الزمنة أو من مشاكل أخرى بالمسالك البولية سوى السلس البولي الإجهادي.
- (ب) اجراء ديناميكية البول لجميع المريضات لتحديد درجة السلس البولي
- (ج) التدخل الجراحى باجراء عملية بيرش لتعليق المهبل أو عملية الشريط المهبل الغير توتري.
- (د) ملاحظة المشاكل الناتجة عن كل من العمليتين و مدى نجاح كل منهما.

(ذ) الأكيد على صحة النتائج عن طريق إعادة اجراء ديناميكية البول لجميع المريضات بعد ستة أشهر من العملية.

٤. عرض نتائج البحث مع الايضاح بواسطة الجداول و الرسوم البيانية.

٥. مناقشة الدلائل العلمية للبحث و مقارنتها بالدلائل التى توصل لها الباحثون السابقون.

٦. تلخيص الباحث للرسالة و كتابة التوصيات بناء على نتائج البحث.

٧. المراجع.

٨. الملخص العربى.


ملخص الرسالة


يعتبر السلس البولى مشكلة بين السيدات حيث يحدث فى حوالى ١٠-٤٥% من السيدات فى جميع المراحل العمرية ومن أهم أسبابه السلس البولى الاجهادى الذى ينتج عن ضعف عضلة الإحليل، وهناك الكثير من العمليات الجراحية لعلاج السلس البولى الاجهادى إلا أن عملية بيرش لتعليق المهبل تظل أهم العمليات الجراحية فى هذا المجال والتى يقاس نجاح العمليات الأخرى بالنسبة لها. وقد أثبتت الدراسة التى تمت على ٦٠ مريضة فى سن الانجاب و تعانين من السلس البولى الاجهادى- من الدرجة الاولى أو الثانية- أن عملية الشريط المهبلى الغير توترى لها نفس نسبة النجاح والفاعلية مثل عملية بيرش لتعليق المهبل. كما أن زمن اجراء العملية قصيرو لا تزيد مضاعفاتها عن الحد المقبول، مما يؤهل عملية الشريط المهبلى لأن تكون من أهم العمليات الجراحية فى هذا المجال. و قد كانت الرسالة مفيدة و مرضية بوجه عام و تشمل مراجعة شاملة و ملمة بالموضوع وترى اللجنة قبولها.


الأستاذ الدكتور
أسماء فريد

الأستاذ الدكتور
جمال وفا

الأستاذ الدكتور
جعفر قناوي







ACKNOWLEDGMENT

First and foremost, I thank God almighty and the most merciful for his gifts to all of us.

I would like to express my deepest thanks, appreciation and gratitude to *Prof. Dr. Gaafar Kinawy, Prof. of Gynaeco/ogy and Obstetrics, Faculty of Medicine, Cairo University*, who gave the privilage of working under his supervision, for his sincere supervision and helpful suggestions. I am really indebted to all the kind help he had offered me which made the completion of this work possible.

I wish to express my sincere thanks, deep gratitude and appreciation to *Prof. Dr. Ahmed Ibrrahim Aref, Prof. of Gynaecology and Obstetrics, Faculty of Medicine, Cairo University* for his valuable guidance, supervision. and continuous support.

I would like also to express my deep gratitude to *Dr. MagedyIbrahim, Ass. Prof. of Gynaecology and Obstetrics, Faculty of Medicine Cairo University* for his continuous outstanding help and thorough revision of every detail in this work.

I wish to express sincere thanks to *Dr. Mohamed Chereen Ramadan , Consultant of Gynaecology and Obstetrics, Al-Galaa Teaching Hospital* for his outstanding effort, helpful suggestion and continuous guidance.

I am very grateful to *Dr. Atef Iskandar, Consultant of Gynaecology and Obstetrics, Al-Matareya Teaching Hospital* for his overwhelming effort and assistance in completion of this study.

Lastly, I would like to express my deepest thanks and appreciation to the whole staff of Al-Matareya Teaching Hospital and all patients who participated in this study. Without their assistance, this work would have never been completed.

